

BOLETÍN DIARIO NO. 282/22 EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE SARGAZO EN EL CARIBE MEXICANO

- El Caribe Mexicano presenta hasta el día 31 de marzo, una cantidad estimada de sargazo de **29,373 Ton.**
- Con base en los registros correspondientes a años anteriores, se espera una tendencia incremental acompañada de algunas fluctuaciones durante los próximos meses; las corrientes locales frente a Quintana Roo y su interacción con el viento, así como tasa de transporte de sargazo del Caribe Central al Caribe Mexicano, determinarán la magnitud en términos de arribo a las costas mexicanas (Figuras 1 y 2).
- Los fuertes vientos del sureste, en conjunto con el sistema de corrientes locales, **continuarán generando arribos de sargazo en cantidades excesivas en todo el litoral de Quintana Roo durante los próximos días.** De acuerdo a los modelos de corrientes y vientos, **se prevé que, durante el fin de semana y principios de la siguiente, continuarán ingresando cantidades excesivas de sargazo en toda la línea de costa, desde Xcalak hasta inmediaciones de Cancún, así como al este y sur de Isla de Cozumel, provocando recales de manera distribuida en todo el litoral** (Figuras 1 y 2).
- **El nivel de alertamiento para la estimación de recales en el Caribe Mexicano, se ubica en la categoría “8”, que corresponde a la denominación de “Excesivo”, según la cual, “en algunas playas, el sargazo se acumula en montículos de más de 90 cm de altura en menos de 24 horas, cubriendo toda la zona de playa y haciendo imposible el tránsito a pie y con maquinaria”, de acuerdo al semáforo y a los criterios de la “Escala para la estimación del recalcado de sargazo en las playas del Caribe Mexicano”, desarrollada por este Instituto Oceanográfico.**
- Actualmente, en la región sur, desde Xcalak hasta inmediaciones de Mahahual, predominan corrientes superficiales con dirección norte y velocidades de 0.58 a 1.88 m/s y en la región norte, desde Sian Ka’an hasta Cancún con dirección noreste y velocidades de 0.67 a 1.73 m/s, encontrándose condiciones de vientos del sureste de 13 a 21 nudos (24 a 39 km/h) (Figura 1).




Figura 1.- Cobertura algal (31 de marzo) y modelación de corrientes superficiales (01 de abril).

**SARGAZO
Caribe mexicano**




Figura 2.- Valores estimados de la cantidad de sargazo en el Caribe Mexicano. Gráfico comparativo de los años 2018, 2019 y 2022 (gráfico mayor) y valores estimados del 01 de enero al 31 de marzo del presente año (gráfico superior derecha) obtenidos a partir de datos de la USF.

Elaboró: Cap. Frag. SMAM. L. Ocean. José Paul Murad Serrano, Ttes. Nav. SMAM. L. Ocean. Reynaldo Vargas Laue y Angélica Reyes Rosales, Tte. Corb SIA I. Geol. Marcos Maldonado Rodríguez, 1/er. Mtre. SIA. T. Q. I. María Laura Méndez Reyes y Meteorólogo José Antonio Rivera Prieto.

Revisó: Cap. Frag. SMAM. L. Ocean. José Paul Murad Serrano.